RATGEBER

Wegovy (Semaglutid): Wirkung, Dosierung, Nebenwirkungen und Kosten

Alles zu Wegovy in einem Beitrag: Zulassung, Wirkung, Dosisschema laut Fachinformation, Studiendaten zu Gewicht und Herz, Nebenwirkungen in Prozent, Vergleich mit Ozempic und Mounjaro, Kosten und Kassenstatus.

Stand 17.11.2026 · 26 Quellen · Wie wir arbeiten · Redaktion humanblood

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Alle akzeptieren

Nur notwendige

Einstellungen anpassen

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

−1
mittle… (STEP 1)

…f-Ereignisse (SELECT)

43,9 %
Übelkeit, meist in der Aufdosierung (Placebo 16,1 %)

277,60 €
Packung 2,4 mg für 4 Wochen (Stand 11/2026)

▼ **Inhalt dieser Seite**

1. Was ist Wegovy und wofür ist es zugelassen?
2. Wie wirkt Wegovy im Körper?
3. Welche Wegovy-Pens und Dosisstufen gibt es?

4. Wie viel nimmt man mit Wegovy ab?
5. Was zeigt Wegovy für Herz und Kreislauf?
6. Welche Nebenwirkungen hat Wegovy und wie häufig sind sie?
7. Wer sollte Wegovy nicht anwenden oder nur mit besonderer Vorsicht?
8. Was ist der Unterschied zwischen Wegovy, Ozempic und Rybelsus?
9. Wegovy oder Mounjaro: Was zeigen Vergleichsstudien?
10. Gibt es Wegovy auch als Tablette?
11. Was passiert, wenn man Wegovy absetzt?
12. Was kostet Wegovy und zahlt die Krankenkasse?
13. Häufige Fragen
14. Q

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Was

Wegov off
Semag ist. Es
wird al ablette
für Erw 1-
Rezept

Anwe

Die eu
kalorie ilt es
zur Ge tens
30 kg/m² (Adipositas) oder von mindestens 27 und unter 30 kg/m² (Übergewicht), wenn mindestens eine gewichtsbedingte Begleiterkrankung vorliegt. Genannt werden Prädiabetes oder Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, obstruktive Schlafapnoe und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie sich der BMI berechnet und wo die Grenzen liegen, erklärt der Beitrag zur BMI-Grenze bei Abnehmspritzen.

Für Jugendliche ab 12 Jahren ist Wegovy zugelassen bei Adipositas (BMI-Perzentile ab 95 nach den CDC-Wachstumskurven) und einem Körpergewicht über 60 kg. Die Fachinformation sieht vor, die Behandlung abzubrechen und neu zu bewerten, wenn der BMI nach 12 Wochen mit 2,4 mg oder der maximal vertragenen Dosis nicht um mindestens 5 % gesunken ist. Für Kinder unter 12 Jahren sind Sicherheit und Wirksamkeit nicht erwiesen.

Was Wegovy nicht ist

Wegovy ist kein Mittel gegen Typ-2-Diabetes. Dafür sind die Präparate Ozempic und Rybelsus mit demselben Wirkstoff, aber anderen Dosisstufen zugelassen. Wegovy ist auch kein Ersatz für Ernährungsumstellung und Bewegung: In allen Zulassungsstudien erhielten sämtliche Teilnehmende, auch die Placebogruppen, eine Lebensstilberatung. Der in den Studien gemessene Unterschied zu Placebo ist deshalb der Effekt des Wirkstoffs zusätzlich zu diesen Maßnahmen.

Wo Wegovy im Vergleich der Wirkstoffe steht

Neben Wegovy sind in der EU weitere Wirkstoffe zur Gewichtsregulierung zugelassen, darunter Liraglutid (Handelsname Saxenda) und Tirzepatid, das zusätzlich den GIP-Rezeptor anspricht (GIP-Hormon im Überblick). Wer die Präparate nebeneinander sehen möchte, findet das im Vergleich Mounjaro und Wegovy und in der Übersicht Welche Abnehmspritze die beste ist.

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Wie

Wegov
Sättigu
Sequer -
Rezept ß
Albumi

Wirku

Der wi tion
beschr
der Ste m über
Regionen wie Septum, Thalamus und Amygdala beeinflussen kann. In klinischen Studien sank die Energieaufnahme, Sättigung und Völlegefühl nahmen zu, Hungergefühle und Heißhungerattacken wurden seltener und weniger intensiv. Die Vorliebe für stark fetthaltige Nahrungsmittel ging zurück.

Wirkung auf Magen und Blutzucker

Im Magen verlangsamt Semaglutid die Entleerung. Die Fachinformation weist allerdings darauf hin, dass bei 2,4 mg keine klinisch relevante Wirkung auf die Geschwindigkeit der Magenentleerung beobachtet wurde, was wahrscheinlich auf einen Toleranzeffekt zurückgeht. Auf den Blutzucker wirkt der Wirkstoff glukoseabhängig: Er steigert die Insulinsekretion und senkt die Glucagonsekretion, wenn der Blutzucker hoch ist. Bei niedrigem

Blutzucker verringert Semaglutid die Insulinsekretion. Deshalb ist eine Unterzuckerung bei Menschen ohne Diabetes selten (zum Langzeit-Blutzuckerwert siehe HbA1c-Wert).

Was die Wirkung nicht leistet

Die Wirkung hält nur an, solange der Wirkstoff im Körper ist. Nach dem Absetzen kehren Appetit und Gewicht im Mittel zurück, wie die Verlängerung der STEP-1-Studie zeigt (Abschnitt zum Absetzen weiter unten). Grundlagen zur Hormonfamilie bietet der Beitrag GLP-1, den Einstieg in die Stoffklasse der Peptide der Beitrag Was sind Peptide.

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

INTERAKTIVE INFOGRAFIK

So wirkt Wegovy im Körper

Sättigung und Hunger ↑ / ↓

Semaglutid wirkt auf Hypothalamus und Hirnstamm. In Studien stiegen Sättigung und Völlegefühl, Hungergefühle und Heißhunger sanken (Fachinformation Wegovy, Abschnitt 5.1).

Belohnungssystem **Septum, Thalamus, Amygdala**

Die Fachinformation nennt direkte und indirekte Wirkungen auf Hirnregionen des Belohnungssystems. Die Vorliebe für stark fetthaltige Nahrung ging in Studien zurück.

M **nt**

La
et
G

M **%**

Ü
A

In **er**

Se
w

Glucagon **↓ bei hohem Blutzucker**

Die Glucagonsekretion sinkt bei hohem Blutzucker. Bei Unterzuckerung wird die Glucagonantwort laut Fachinformation nicht vermindert.

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Gewicht **−14,9 %**

Mittlerer Gewichtsverlust nach 68 Wochen in STEP 1 (n = 1.961), Placebo −2,4 % (PMID 33567185).

Körperzusammensetzung **Fett −19,3 %**

In der DEXA-Teilstudie von STEP 1 sank die Fettmasse um 19,3 %, das viszerale Fett um 27,4 %, die fettfreie Masse um 9,7 % (Wilding et al., J Endocr Soc 2021).

Welche Wegovy-Pens und Dosisstufen gibt es?

Wegov
Erwach ion
sieht fü n-
Beschw er;
über D t.

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

ZEIT		
Woc		
Woc		
Woc		
Woche 13 bis 16	1,7 mg	Steigerung nach vier Wochen
ab Woche 17	2,4 mg	Erhaltungsdosis
nach mindestens 4 Wochen mit 2,4 mg	7,2 mg	nur Erwachsene mit Ausgangs-BMI ab 30; bei fehlender weiterer Verbesserung Rückkehr auf 2,4 mg

Bei erheblichen Magen-Darm-Beschwerden kann laut Fachinformation die Steigerung verzögert oder auf die vorherige Dosis zurückgegangen werden. Für Jugendliche gilt

dasselbe Schema bis 2,4 mg oder bis zur maximal vertragenen Dosis; höhere Dosen als 2,4 mg werden bei Jugendlichen nicht empfohlen.

Pen, Einzeldosis-Pen oder Fertigspritze?

Die Fachinformation führt mehrere Darreichungsformen auf. Der FlexTouch-Pen ist ein Mehrfachgebrauchs-Pen, der vier Wochendosen enthält und mit vier Einwegnadeln geliefert wird. Daneben gibt es Fertigpens zum Einmalgebrauch in einer Packung mit vier Pens (0,25 bis 7,2 mg) sowie Fertigspritzen. Welche Packungen tatsächlich in Deutschland angeboten werden, kann abweichen; die Fachinformation vermerkt selbst, dass möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht werden. Die 7,2-mg-Dosis kann je nach Injektionsgerät als eine Injektion oder als drei Injektionen zu je 2,4 mg verabreicht werden.

Zur Bedienung des FlexTouch-Pens und zur Dosisanzeige gibt der Beitrag Wegovy-Klicks eine eigene

Ausge

Die Fac n fünf Tagen wird sie übe sis für die Wie lt werden en. Wegov Obersc


Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

GRAFIK

Wegovy: Aufdosierung laut Fachinformation (Erhaltungsdosis 2,4 mg)



▼ W

Wo

Wo

Wo

Wo

ab

Quel

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Wie viel nimmt man mit Wegovy ab?

In der Zulassungsstudie STEP 1 verloren Erwachsene ohne Diabetes mit Wegovy nach 68 Wochen im Mittel 14,9 % ihres Körpergewichts (15,3 kg), unter Placebo waren es 2,4 %. Die Studie schloss 1.961 Menschen mit Übergewicht oder Adipositas ein (Wilding et al., NEJM 2021, PMID 33567185). In der Tabelle der Fachinformation lag der Anteil mit mindestens 5 % Gewichtsverlust bei 83,5 %, mit mindestens 10 % bei 66,1 % und mit mindestens 15 % bei 47,9 % (Placebo: 31,1 %, 12,0 % und 4,8 %). Die Originalpublikation nennt je nach Analysemethode etwas höhere Anteile.

Wie unterscheidet sich der Effekt je nach Population?

Der Mittelwert hängt von der untersuchten Gruppe ab. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes lag der Verlust in STEP 2 nach 68 Wochen bei 9,6 % (Placebo 3,4 %; Davies et al., Lancet 2021, PMID 33667417). Über zwei Jahre blieb der Effekt in STEP 5 erhalten: 15,2 % gegenüber 2,6 % unter Placebo (Garvey et al., Nat Med 2022, PMID 36216945). Bei Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren sank in STEP TEENS der BMI nach 68 Wochen um 16,1 % (Placebo +0,6 %); das Körpergewicht ging um 14,7 % zurück, im Placebovergleich um 17,4 Prozentpunkte (Weghuber et al., NEJM 2022, PMID 36322838; Fachinformation Tabelle 13).

STUDIE	POPULATION, DAUER	WEGOVY	PLACEBO	QUELLE
STEP 1	1.961 Erwachsene ohne Diabetes, 68 Wochen	−14,9 %	−2,4 %	PMID 33567185
STEP				17
STEP				45
STEP				52
STEP TEEN				38

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Was bringt die höhere Dosis von 7,2 mg?

In STEP UP (n = 1.407) sank das Gewicht nach 72 Wochen unter 7,2 mg um 18,7 %, unter 2,4 mg um 15,6 % und unter Placebo um 3,9 % (Wharton et al., Lancet Diabetes Endocrinol 2025, PMID 40961952). Der Unterschied zwischen den beiden Dosen beträgt rund drei Prozentpunkte. Die Fachinformation führt unter 7,2 mg häufiger Hautmissempfindungen (Dysästhesie) auf: In STEP UP berichteten 21,6 % der Behandelten mit 7,2 mg solche Ereignisse, unter Placebo 0,3 %.

Wie schnell geht es?

Praxisdaten der Mayo Clinic zeigen im Mittel 5,9 % Gewichtsverlust nach drei und 10,9 % nach sechs Monaten (Ghusn et al., JAMA Netw Open 2022, PMID 36121652). In STEP 4 hatten die Teilnehmenden nach den ersten 20 Wochen 10,6 % verloren (Rubino et al., JAMA 2021, PMID

33755728). Ausführlicher beschreibt der Beitrag Wegovy-Erfahrungen den Verlauf nach Wochen, und der Beitrag Wie lange man eine Abnehmspritze anwendet ordnet die Behandlungsdauer ein.

Der Rechner rechnet den Studienmittelwert auf ein eingegebenes Körpergewicht um. Er zeigt einen Durchschnitt aus Studien und keine Prognose: Einzelne Verläufe liegen deutlich darüber oder darunter, und etwa jede sechste Person erreichte in STEP 1 laut Fachinformation keine 5 % (16,5 %).


Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

GRAFIK

Mittlerer Gewichtsverlust unter Wegovy in den Zulassungsstudien



Placebo · STEP UP 2,4 mg (72 Wochen)	3,9 %
Semaglutid · STEP UP 7,2 mg (72 Wochen)	18,7 %
Placebo · STEP UP 7,2 mg (72 Wochen)	3,9 %

Quelle: Wilding 2021 (PMID 33567185); Davies 2021 (PMID 33667417); Garvey 2022 (PMID 36216945); Wharton 2025 (PMID 40961952)

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Was zeigt Wegovy für Herz und Kreislauf?

In der Studie SELECT senkte Wegovy bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankung und Übergewicht, aber ohne Diabetes, das Risiko für Herztod, nicht tödlichen Herzinfarkt oder Schlaganfall um relativ 20 %. Eingeschlossen waren 17.604 Erwachsene mit bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankung und BMI ab 27 kg/m², die zusätzlich zur Standardbehandlung 2,4 mg Semaglutid (n = 8.803) oder Placebo (n = 8.801) erhielten. Die mediane Beobachtungszeit betrug 41,8 Monate (Fachinformation, Abschnitt 5.1; Lincoff et al., NEJM 2023, PMID 37952131).

Die Zahlen aus SELECT

Der primäre Endpunkt trat bei 569 Personen (6,5 %) unter Semaglutid und bei 701 Personen (8,0 %) unter Placebo auf. Die Hazard Ratio betrug 0,80 (95-%-Konfidenzintervall 0,72 bis 0,90). Für den kardiovaskulären Tod allein lag sie bei 0,85 (0,71 bis 1,01), das Konfide ng nicht von Alt tion abhing änner. Der Be nicht automa

Ein Na aglutid häufige D 37952

Herzi

Für die en die Studier tieg der Sy Punkte m 1,2 Meter. Das Gewicht sank um 13,8 % (Placebo 2,4 %; Rosiborod et al., NEJM 2023, PMID 37622681; Fachinformation Tabelle 12). In der Teilstudie bei Typ-2-Diabetes (STEP-HFpEF-DM) fielen die Effekte kleiner aus: Gewicht −9,8 % gegenüber −3,4 %, Symptomscore +13,7 gegenüber +6,4 Punkten.

Wie die Herz-Daten einzuordnen sind

Wegovy ist in erster Linie zur Gewichtsregulierung zugelassen. Die Fachinformation verweist in Abschnitt 4.1 für diese Ergebnisse auf Abschnitt 5.1. Ob eine Behandlung bei einer Herzerkrankung sinnvoll ist, klärt die behandelnde Kardiologin oder der behandelnde Kardiologe. Der Wirkstoff selbst ist im Beitrag Semaglutid mit allen Studien beschrieben, eine Übersicht der Forschung bietet Semaglutid-Studien.


Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

GRAFIK

SELECT: Schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse nach rund 3,5 Jahren



▼ W

Se

Pla

Quel

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Wel… sind sie?

Die häu… wöchige… %), Durchfall bei 29,7 % (15,9 %), Erbrechen bei 24,5 % (6,3 %), Verstopfung bei 24,2 % (11,1 %) und Bauchschmerzen bei 19,7 % (10 %). Die meisten Ereignisse waren leicht bis mittelschwer und von kurzer Dauer. Sie traten vor allem in der Dosissteigerung auf (Fachinformation, Abschnitt 4.8).

Wie lange dauern die Beschwerden?

Die Fachinformation nennt für Semaglutid eine mittlere Dauer von 8 Tagen für Übelkeit, 2 Tagen für Erbrechen und 3 Tagen für Durchfall. Verstopfung hielt mit im Mittel 47 Tagen deutlich länger an. In STEP 1 beendeten 4,5 % die Behandlung wegen Magen-Darm-Beschwerden (Placebo 0,8 %). Wie lange die Übelkeit in der Praxis anhält, behandelt der Forenbeitrag Übelkeit unter Mounjaro und Wegovy; eine Gesamtübersicht über alle Präparate

gibt Abnehmspritze: Nebenwirkungen, die wirkstoffbezogene Darstellung Semaglutid: Nebenwirkungen.

Seltenere Nebenwirkungen mit Zahlen

EREIGNIS	WEGOVY	PLACEBO	HINWEIS
Gallensteine (Cholelithiasis)	1,6 %	1,1 %	Gallenblasenentzündung 0,6 % gegenüber 0,3 %
Haarausfall	2,5 %	1,0 %	häufiger bei Gewichtsverlust ab 20 %; unter 7,2 mg 5,3 %
Haut (Dys			%
Akut			über
Anst Herz			

Haarau r Behand ter 7,2 mg kla ungen unter A

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Sehr seltene und beobachtete Risiken

Die Fachinformation führt unter den sehr seltenen Nebenwirkungen die nichtarteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie (NAION) auf, einen plötzlichen Sehverlust durch eine Durchblutungsstörung des Sehnervs. Die EMA-Sicherheitsbehörde PRAC stufte NAION im Juni 2025 als sehr seltene Nebenwirkung ein; die Schätzung liegt bei etwa einem zusätzlichen Fall pro 10.000 Personenjahre. Beobachtungsstudien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, eine Studie fand ein deutlich erhöhtes Risiko (Hathaway et al., JAMA Ophthalmol 2024, PMID 38958939). Bei plötzlichem Sehverlust nennt die Fachinformation eine augenärztliche Untersuchung. Darmverschluss wurde aus Berichten nach der Markteinführung bekannt, Angioödeme und anaphylaktische Reaktionen sind selten.

Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes kommen Unterzuckerungen (besonders zusammen mit Insulin oder Sulfonylharnstoffen) und eine mögliche Verschlechterung einer diabetischen Retinopathie hinzu. In STEP 2 trat eine klinisch signifikante Hypoglykämie bei 6,2 % unter Semaglutid und 2,5 % unter Placebo auf. Erhöhte Lipase- und Amylasewerte erklärt der Beitrag Lipase erhöht; ein Anstieg der Enzyme allein ist laut Fachinformation nicht aussagekräftig für eine akute Pankreatitis. Zu Leberwerten siehe Leberwerte erhöht. Die Meldung vermuteter Nebenwirkungen an das nationale System ist ausdrücklich erwünscht.


Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

GRAFIK

Häufigste Nebenwirkungen im 68-Wochen-Programm (STEP 1–4)



Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

▼ W

Üb	
Du	
Erb	
Ver	
Bau	
Übelkeit	16,1 % der Behandelten
Durchfall	15,9 % der Behandelten
Erbrechen	6,3 % der Behandelten
Verstopfung	11,1 % der Behandelten
Bauchschmerzen	10 % der Behandelten

Quelle: Fachinformation Wegovy, Abschnitt 4.8 (Pool der Phase-3a-Studien STEP 1–4, 68 Wochen)

Wer sollte Wegovy nicht anwenden oder nur mit besonderer Vorsicht?

Als einzige Gegenanzeige nennt die Fachinformation eine Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen sonstigen Bestandteil. Daneben enthält Abschnitt 4.4 eine Reihe von Warnhinweisen, bei denen eine ärztliche Abwägung nötig ist. Diese Übersicht fasst sie als Information zusammen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Kinderwunsch

Wegovy darf in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet werden. Wegen der langen Halbwertszeit muss Semaglutid laut Fachinformation mindestens zwei Monate vor einer geplanten Schwangerschaft abgesetzt werden. Frauen im gebärfähigen Alter wird eine Verhütungsmethode während der Behandlung empfohlen. Tierstudien haben eine Reproc nzt. Ob Semag

Vorer

- **Früh** zen; wur erer Pan
- **Diab** en häuf cht emp
- **Gas** schw
- **Nier** ird die Anwe en, die selten die Nierenfunktion verschlechtert.
- **Typ-1-Diabetes, NYHA-Stadium IV, mittelschwere oder schwere Leberfunktionsstörung:** Wegovy wurde bei diesen Gruppen nicht untersucht, eine Anwendung wird nicht empfohlen.
- **Entzündliche Darmerkrankung und Alter ab 85 Jahren:** Es gibt nur begrenzte Erfahrungen, Vorsicht ist geboten.

Narkose, Operationen und andere Arzneimittel

Unter GLP-1-Rezeptoragonisten wurden Fälle von Aspirationspneumonie bei Vollnarkose oder tiefer Sedierung berichtet. Die Fachinformation fordert, das erhöhte Risiko von Mageninhaltsresten vor solchen Eingriffen zu bedenken. Wegovy darf nicht zusammen mit

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

einem anderen GLP-1-Rezeptoragonisten angewendet werden. Weil Semaglutid die Magenentleerung verzögert, kann es die Aufnahme gleichzeitig eingenommener Tabletten beeinflussen; bei 2,4 mg wurde in Studien allerdings keine klinisch relevante Wirkung gemessen. Schwindel kommt vor allem in der Dosissteigerung vor; die Fachinformation rät beim Autofahren dann zur Vorsicht.

Vorerkrankungen und die Dauermedikation gehören vor Beginn in die ärztliche Abklärung. Außerdem verlangt die Fachinformation, Name und Chargenbezeichnung des angewendeten Arzneimittels eindeutig zu dokumentieren, damit sich das Präparat zurückverfolgen lässt.

Was ist der Unterschied zwischen Wegovy, Ozempic und Rybelsus?

Wegov… Zulass… …lassen (bis 2,4… …-2-Diabet… …z.

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

MERI…			
Zula… EU			…tes …enen
Darr…			…nal
Dosisbereich laut Fachinformation	0,25 bis 2,4 mg, optional 7,2 mg	0,25 bis 2 mg; über 2 mg nicht empfohlen	eigene Tablettenstärken
Kostenübernahme durch die GKV	bei Gewichtsreduktion ausgeschlossen	bei Typ-2-Diabetes erstattungsfähig	bei Typ-2-Diabetes erstattungsfähig

Die Fachinformation von Ozempic nennt als Anwendungsgebiet den unzureichend kontrollierten Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen, als Monotherapie oder zusätzlich zu anderen Arzneimitteln. Die Dosis beginnt mit 0,25 mg, wird nach vier Wochen auf 0,5 mg erhöht und kann nach mindestens vier weiteren Wochen auf 1 mg und danach auf 2 mg steigen; 0,25 mg ist ausdrücklich keine Erhaltungsdosis. Höhere wöchentliche Dosen als 2 mg werden nicht empfohlen. Eine Einordnung des Präparats findet sich im Beitrag Ozempic, die Tablettenformen behandeln Semaglutid-Tabletten und GLP-1-Tabletten.

Warum das Präparat wichtig ist

Wird Ozempic ohne Diabetes zur Gewichtsabnahme verordnet, handelt es sich um eine Anwendung außerhalb der Zulassung (Off-Label). Für Wegovy gilt dagegen die Zulassung zur Gewichtsregulierung; Preis und Erstattungsfrage richten sich nach diesem Präparat, mehr im Abschn

Weg

In der
stärker
2025,
Vergle
Zulass
tabella

Wego

In STE
68 Wo
Behand
abgebrochen (Rubino et al., JAMA 2022, PMID 35015037). Die Einordnung von Liraglutid und der zugehörigen Marke Saxenda steht in eigenen Beiträgen.

Wechsel zwischen den Präparaten

Wer von Wegovy auf Mounjaro wechselt oder umgekehrt, bespricht das ärztlich. Der Forenbeitrag Wechsel von Wegovy zu Mounjaro trägt die verfügbaren Hinweise zusammen. Wie sich der Verlauf unter dem zweiten Wirkstoff darstellt, beschreibt der Beitrag Mounjaro-Erfahrungen. Zu Wirkstoffen in Entwicklung liefert Retatrutid-Studien den Stand der Forschung, zum oralen Wirkstoff Orforglipron der Beitrag Orforglipron.

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Gibt es Wegovy auch als Tablette?

Ja, die EU hat Wegovy als Tablette für Erwachsene am 15. Juli 2026 zugelassen, seit dem 1. September 2026 ist sie in deutschen Apotheken verfügbar. In der Zulassungsstudie OASIS 4 (n = 307, 64 Wochen) senkte die Tablette mit 25 mg täglich das Gewicht um 13,6 %, unter Placebo um 2,2 % (Wharton et al., NEJM 2025, PMID 40934115). Magen-Darm-Nebenwirkungen traten bei 74,0 % der Behandelten auf, unter Placebo bei 42,2 %.

Der Vergleich mit der Spritze (14,9 % in STEP 1) ist indirekt: Die Studien hatten unterschiedliche Teilnehmende und unterschiedliche Dauer. Die Tablette wird nüchtern mit etwas Wasser eingenommen, mit anschließender Wartezeit, weil die Aufnahme von der Magenfüllung abhängt. Die Fachinformation der Tablette enthält dazu genaue Vorgaben, die im Beitrag Wegovy-Tabletten ausführlich beschrieben sind. Der Wechsel von der Tablette (25 mg täglich) auf die Spritze (2,4 mg einmal wöchentlich) ist ohne Zeitabstand möglich. Wer gerege… …nes Wechs… …ablette stärker…

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Was…

Nach d… …er Verläng… …en; ein Jahr na… …%, zwei D… 354414… …werten wieder…

STEP 4… Teilnehmende randomisiert. Unter fortgesetzter Behandlung sank das Gewicht in den folgenden 48 Wochen um weitere 7,9 %, unter Placebo stieg es um 6,9 % (Rubino et al., JAMA 2021, PMID 33755728). Die Autoren der STEP-1-Verlängerung lesen das als Hinweis, dass Adipositas eine chronische Erkrankung ist, bei der die Verbesserungen nur unter fortgesetzter Behandlung bestehen bleiben.

Warum Menschen abbrechen

Im Alltag brechen viele die Behandlung früh ab. In einer US-Kohorte von 125.474 Erwachsenen hatten nach einem Jahr 64,8 % der Menschen ohne Typ-2-Diabetes die Behandlung beendet, mit Diabetes 46,5 % (Rodriguez et al., JAMA Netw Open 2025, PMID 39888616). Eine Auswertung von Patientenakten nannte als Gründe zu 47,6 % Kosten oder Versicherungsfragen, zu 14,6 % Nebenwirkungen und zu 11,8 % Lieferengpässe (Gasoyan et

al., Obesity 2025, PMID 41039650). Mehr zum Verlauf nach dem Ende der Behandlung bietet der Forenbeitrag Abnehmspritze absetzen und Gewicht danach.

Muskeln und Körperzusammensetzung

Beim Gewichtsverlust geht auch fettfreie Masse verloren. Eine Metaanalyse randomisierter Studien ergab, dass unter Semaglutid 35,2 % des Gewichtsverlusts aus fettfreier Masse bestanden, unter Lebensstilmaßnahmen mit Krafttraining 17,5 % (Eisa et al., Diabetes Obes Metab 2026, PMID 41877354). Die DEXA-Teilstudie von STEP 1 zeigte eine Abnahme der Fettmasse um 19,3 % und der fettfreien Masse um 9,7 %. Der Anteil der fettfreien Masse an der Gesamtmasse stieg dabei an. Die Daten zur Muskelmasse sind im Forenbeitrag Muskelabbau unter GLP-1: DEXA-Daten zusammengestellt.

GRA

STE ahr
spä

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

▼ Werte als Tabelle

Woche 68 (Ende der Behandlung)	17,3 % des Ausgangsgewichts
Woche 120 (ein Jahr ohne Wirkstoff)	5,6 % des Ausgangsgewichts

Quelle: Wilding et al., Diabetes Obes Metab 2022, PMID 35441470

Was kostet Wegovy und zahlt die Krankenkasse?

Wegovy kostet auf Privatrezept 172,73 € je Packung für vier Wochen in den Einstiegsstufen bis 1,0 mg, 237,14 € für 1,7 mg, 277,60 € für 2,4 mg und 383,80 € für 7,2 mg

(Apothekenverkaufspreise laut Fachpresse und Preisportal, Stand November 2026). Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten zur Gewichtsreduktion nicht. Mit der Erhaltungsdosis 2,4 mg ergeben sich rechnerisch 3.608,80 € pro Jahr, im ersten Jahr wegen der günstigeren Einstiegsstufen 3.253,73 €. Alle Dosisstufen, die Tabletten und die Jahreskosten stehen im Beitrag Wegovy-Kosten; einen Überblick über alle Präparate gibt Abnehmspritze Kosten.

Warum die GKV nicht zahlt

Nach § 34 SGB V sind Arzneimittel, bei denen eine Gewichtsabnahme im Vordergrund steht, von der Versorgung ausgeschlossen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat Wegovy zur Gewichtsreduktion mit Beschluss vom 21. März 2024 in Anlage II der Arzneimittel-Richtlinie aufgenommen, die Liste der sogenannten Lifestyle-Arzneimittel. Ozempic bleibt bei Typ-2-Di
Diabet
bezieh
Kranke

Tarif

Rezep

Wegov
Produk
geprüf
BfArM
Semag
im Inte
bis 14

te
cht
Das
att
zept
n 7

Aufbe

Wegovy wird im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C gelagert, vom Kühlelement ferngehalten und nicht eingefroren. Der FlexTouch-Pen ist vor der ersten Anwendung drei Jahre haltbar und nach dem ersten Gebrauch sechs Wochen, bei Lagerung unter 30 °C oder im Kühlschrank. Einzeldosis-Pens und Fertigspritzen dürfen laut Fachinformation bis zu 28 Tage ungekühlt bei höchstens 30 °C gelagert werden, danach sind sie zu entsorgen. Die Lösung darf nicht verwendet werden, wenn sie nicht klar und farblos bis nahezu farblos aussieht.

WICHTIG

Diese Seite informiert über Studien, Zulassung und Rechtslage. Sie fasst veröffentlichte Forschung zusammen, spricht keine Empfehlungen aus und ersetzt keine ärztliche

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Beratung. Dosierungs- oder Anwendungsanleitungen für nicht zugelassene Stoffe enthält sie bewusst nicht.

Häufige Fragen

Was ist Wegovy?

Wegovy ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel mit dem Wirkstoff Semaglutid, das Novo Nordisk herstellt. In der EU ist es seit dem 6. Januar 2022 zur Gewichtsregulierung zugelassen, als Ergänzung zu kalorienreduzierter Ernährung und mehr Bewegung. Es wird einmal pro Woche unter die Haut gespritzt, seit 2026 gibt es auch eine Tablette für Erwach Die Zulass Begleit Körper

Wie vi

In der Mittel 14,9 % Typ-2- Diabet P 5 mit 15, ng- Dosis 1 nation verlore

Wann beginnt Wegovy zu wirken?

Die Wirkung auf Appetit und Sättigung beginnt schon in den ersten Wochen, der Gewichtsverlust ist in den niedrigen Dosisstufen aber noch klein, weil die Dosis über 16 Wochen schrittweise steigt. Praxisdaten der Mayo Clinic zeigen im Mittel 5,9 % nach drei Monaten und 10,9 % nach sechs Monaten. In STEP 4 waren es nach 20 Wochen 10,6 %. Die stärkste Abnahme liegt demnach im ersten halben Jahr, danach flacht die Kurve ab. In STEP 5 lag der Mittelwert nach zwei Jahren bei 15,2 %, nur wenig über den 14,9 % nach 68 Wochen in STEP 1.

Welche Nebenwirkungen hat Wegovy am häufigsten?

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Am häufigsten sind Magen-Darm-Beschwerden: Übelkeit bei 43,9 % (Placebo 16,1 %), Durchfall bei 29,7 %, Erbrechen bei 24,5 %, Verstopfung bei 24,2 % und Bauchschmerzen bei 19,7 %. Sie treten vor allem bei der Dosissteigerung auf und waren meist leicht bis mittelschwer. Die Übelkeit dauerte im Mittel 8 Tage, die Verstopfung 47 Tage. Seltener sind Gallensteine (1,6 %), Haarausfall (2,5 %) und eine akute Pankreatitis (0,2 %). Sehr selten wurde ein Sehnervinfarkt (NAION) berichtet. Die Zahlen stammen aus der Fachinformation.

Wer darf Wegovy nicht anwenden?

Die Fachinformation nennt als Gegenanzeige nur eine Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen Bestandteil. In der Schwangerschaft und Stillzeit darf Wegovy nicht angewendet werden; bei Kinderwunsch ist es mindestens zwei Monate vorher abzusetzen. Bei schwerer Nierenfunktionsstörung, Typ-1-Diabetes, schwerer Gastroparese, unkontrollierter diabeti… g nicht e… der Vorerk…

Was ko…

Auf Pri… ufen bis 1,0 … (Apoth… Jahr. Der Pre… Selbstz… ht automa… Laboru…

Zahlt die Krankenkasse Wegovy?

Die gesetzliche Krankenkasse zahlt Wegovy zur Gewichtsreduktion nicht. Nach § 34 SGB V sind Arzneimittel zur Abmagerung und Zügelung des Appetits von der Versorgung ausgeschlossen, und der G-BA hat Wegovy am 21. März 2024 in die Liste der Lifestyle-Arzneimittel aufgenommen. Das gilt unabhängig vom BMI. Private Krankenversicherungen und die Beihilfe prüfen im Einzelfall und nach Tarif; eine vorherige Kostenzusage schafft Klarheit. Bei Typ-2-Diabetes übernimmt die GKV dagegen Ozempic, weil sich dessen Zulassung auf die Behandlung des Diabetes bezieht.

Was ist der Unterschied zwischen Wegovy und Ozempic?

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Beide enthalten Semaglutid. Wegovy ist zur Gewichtsregulierung zugelassen, mit Dosen bis 2,4 mg und optional 7,2 mg. Ozempic ist für Typ-2-Diabetes zugelassen, mit Dosen bis 2 mg; höhere Dosen werden laut Fachinformation nicht empfohlen. Die Kostenübernahme durch die GKV folgt dieser Zulassung: Ozempic bei Diabetes ja, Wegovy zur Gewichtsabnahme nein. Wird Ozempic ohne Diabetes zur Gewichtsabnahme verordnet, ist das eine Anwendung außerhalb der Zulassung. Die Präparate unterscheiden sich außerdem in den Pens und Packungen.

Ist Mounjaro stärker als Wegovy?

In der direkten Vergleichsstudie SURMOUNT-5 senkte Tirzepatid (Mounjaro) das Gewicht im Mittel um 20,2 %, Semaglutid (Wegovy) um 13,7 %. Das sind 6,5 Prozentpunkte Unterschied zugunsten von Tirzepatid. Ob dieser Vorteil im Einzelfall relevant ist, hängt von Verträglichkeit, Begleit aten aus SE Mounja behand

Was pa

Im Mitt ar ein Jahr na erlust lag bei Ausgar ndlung in 48 W sank. Im Allta

Verliert man mit Wegovy auch Muskelmasse?

Ja, ein Teil des Gewichtsverlusts besteht aus fettfreier Masse. In der DEXA-Teilstudie von STEP 1 sank die Fettmasse um 19,3 % und die fettfreie Masse um 9,7 %, der relative Anteil der fettfreien Masse stieg dabei. Eine Metaanalyse randomisierter Studien ermittelte für Semaglutid einen Anteil von 35,2 % fettfreier Masse am Gewichtsverlust, bei Lebensstilmaßnahmen mit Krafttraining waren es 17,5 %. Fettfreie Masse ist nicht mit Muskelmasse gleichzusetzen, sie enthält auch Wasser und Organgewebe.

Gibt es Wegovy als Tablette?

Ja, die EU hat Wegovy als Tablette am 15. Juli 2026 zugelassen, seit dem 1. September 2026 ist sie in deutschen Apotheken erhältlich. In OASIS 4 senkte die Tablette mit 25 mg täglich das

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

Gewicht in 64 Wochen um 13,6 % (Placebo 2,2 %). Magen-Darm-Nebenwirkungen traten bei 74,0 % auf. Die Tablette muss nüchtern mit einer Wartezeit eingenommen werden, damit der Wirkstoff aufgenommen wird. Das genaue Vorgehen und die Stufen beschreibt der Beitrag zu den Wegovy-Tabletten.

Quellen

1. Wilding JPH et al., N Engl J Med 2021 (STEP 1). PubMed: PMID 33567185
2. Davies M et al., Lancet 2021 (STEP 2, Typ-2-Diabetes). PubMed: PMID 33667417
3. Rubino D et al., JAMA 2021 (STEP 4, Fortsetzung vs. Placebo). PubMed: PMID 33755728
4. Garvey WT et al., Nat Med 2022 (STEP 5, zwei Jahre). PubMed: PMID 36216945
5. Wild… …bMed: PMI…
6. Rubi… …37
7. Weg…
8. Linc…
9. Kosi…
10. Wha… …961952
11. Wha… …15
12. Aron… …: PMID 403…
13. Ghus… …652
14. Rodr… …388616
15. Gasoy… …
16. Eisa N et al., Diabetes Obes Metab 2026 (fettfreie Masse, Metaanalyse). PubMed: PMID 41877354
17. Hathaway JT et al., JAMA Ophthalmol 2024 (NAION unter Semaglutid). PubMed: PMID 38958939
18. Ashraf AR et al., JAMA Netw Open 2024 (Testbestellungen Semaglutid ohne Rezept). PubMed: PMID 39093567
19. Wilding JPH et al., J Endocr Soc 2021 (STEP 1, DEXA-Teilstudie). pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8089287/
20. EMA: Wegovy, Produktinformation (Fachinformation, deutsch). ema.europa.eu/de/documents/product-information/wegovy-epar-p

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum

21. EMA: Ozempic, Produktinformation (Fachinformation, deutsch). ema.europa.eu/de/documents/product-information/ozempic-epar-
22. EMA: Wegovy, EPAR. ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/wegovy
23. EMA: PRAC stuft NAION als sehr seltene Nebenwirkung von Semaglutid ein. ema.europa.eu/en/news/prac-concludes-eye-condition-naion-ver
24. G-BA: Pressemitteilung zu Abnehmmitteln (Anlage II Arzneimittel-Richtlinie), 21.03.2024. g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1170/
25. § 34 SGB V (Ausgeschlossene Arznei-, Heil- und Hilfsmittel). gesetze-im-internet.de/sgb_5/__34.html
26. apotheke adhoc: BfArM bestätigt Insulin statt Semaglutid in gefälschten Pens. apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/pharmazie/bfarm-bestaet

Ihre Privatsphäre auf humanblood

Wir möchten anonymisiert messen, welche Artikel gelesen werden, damit wir unser Angebot verbessern können. Dafür nutzen wir Google Analytics 4, aber nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird keine Verbindung zu Google aufgebaut. Die Seite funktioniert in jedem Fall vollständig.

Sie können Ihre Entscheidung jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Seitenende ändern oder widerrufen. Datenschutzerklärung · Impressum